



LES MARQUEURS TUMORAUX DANS LE DEPISTAGE DE PATIENTS ASYMPTOMATIQUES

1. Le dosage des marqueurs tumoraux tel CEA, Ca15-3, Ca 19-9 ou Ca 125 n'est pas indiqué dans le dépistage du cancer (sein, ovaire, colon, etc.)
2. Dépistage du cancer de la prostate par le PSA.
Le conseil scientifique estime que les données de la littérature ne sont pas suffisantes pour proposer un dépistage à large échelle.
Des études sont en cours et les médecins sont invités à informer leurs patients des conséquences éventuelles des résultats du dépistage avant de prescrire un contrôle du PSA.

REFERENCES

- Robert C. Bast, Jr, Peter Ravdin, Daniel F. Hayes, et al : ASCO SPECIAL ARTICLE : 2000 Update of Recommendations for the Use of Tumor Markers in Breast and Colorectal Cancer : Clinical Practice Guidelines of the American Society of Clinical Oncology. Journal of Clinical Oncology·2001 ; 19 : 1865-1878.
- Robert C. Bast, Jr : Status of Tumor Markers in Ovarian Cancer Screening. Journal of Clinical Oncology· 2003 ; 21 : 200s-205s.
- Stephen Frankel, George Davey Smith, Jenny Donovan, David Neal : Screening for prostate cancer. The Lancet·2003 ; 361 : 1122-28.
- National Cancer Institute : www.cancernet.nci.nih.gov. : Prostate cancer screening.

Groupe de travail

Dr Carlo BOCK: chargé de la rédaction
Dr Guy BERCHEM (expert externe)
M. Marcel BRUCH
Dr Françoise GEISEN (experte externe)
Dr Danielle HANSEN-KOENIG
Dr Frank JACOB (expert externe)
Dr Paul KOCH
Dr Serge MEYER (expert externe)
Dr Hinda MECELLEM (experte externe)
Dr Stefan RAUH (expert externe)
Dr Frank SCHUMACHER (expert externe)
Dr Michel UNTEREINER (expert externe)